



اصطدام الإسكي الفخذي الفخذي

لتعرّف يف

ما يظهر لدى الإناث عن انحباس الأنسجة الرخوة الناجم عن تضييق المساحة بين الحوض والطرف العلوي لعظم الفخذ (عند المدور الأصغر). تشمل هيكل الأنسجة الرخوة التي غالباً ما تتأثر والتي تمر عبر هذا الحيز الإسكي الفخذي الفخذية الرباعية الفخذية والعصب الوركي.

غالباً ما تحدث هذه الحالة بسبب صدمة سابقة أو بعد إجراء جراحة لاستبدال الورك بالكامل. [ق1] [ق2][[ق3] [ق4]

الشكل 2: رسم توضيحي يوضح موقع العضلة الرباعية الفخذية




Figure 1: Diagram of the pelvis showing location of the ischium and femur

PATIENT INFORMATION FACT SHEET

العلامات والأعراض - ألم في أسفل الأرداف أو الأريبة أو الفخذ من الداخل - إحساس بالنقر أو الانغلاق أو الطقطقة عند المشي، غالباً ما يكون أكثر تحديداً عندما تكون الساق ممدودة خلف الجسم.
الم يحاكي ألم عرق النساء مع بعض الأفراد الذين يعانون من - أعراض عصبية قاصرية مثل الوخز والخدر الناتج عن اصطدام العصب الوركي




Figure 2: Illustration showing location of the quadratus femoris muscle



التخسيص

ام الإسكي الفخذى الفخذى وغالباً ما تتفاقم الأعراض على مدى فترة طويلة من الزمن. قد يؤدي هذا التأخير أيضاً إلى ظهور أعراض أخرى مثل آلام أسفل الظهر الناجمة عن تغير المشية والوضعيات الناتجة عن محاولات تجنب الألم المزمن.

قد تؤدي الاختبارات المحددة التي يتم إجراؤها أثناء الفحص البدنى إلى إثارة الألم الذي عادة ما يعاني منه المريض. قد يوفر تقييم الحركة والقدرة على المشي أيضاً أدلة على السبب الكامن وراء الألم.

قد تكون هناك حاجة إلى الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب لتأكيد التشخيص. عندما لا يكون التشخيص الأولي ممكناً على الرغم من وجود أعراض موحية، فإن تكرار التصوير بالرنين المغناطيسي بمروء الوقت قد يؤكّد لاحقاً حدوث تغييرات تتفق مع وجود اصطدام إسكي الفخذ.


العلاج غير الجراحي

- تصحيح أي اختلافات في طول الساق.
- العلاج الطبيعي الذي يعالج أي اختلالات في العضلات حول الورك والوحوض، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية عضلات الورك الخاطفة.
- معالجة الألم.
- الحقن بالكورتيكosteroid الموجه بالصور.
- في حالة فشل التدابير التحفظية، يمكن التفكير في جراحة الحفاظ على الورك.

العلاج الجراحي

斯基 الفخذى وفقاً للأنسجة الرخوة المتأثرة والمتضررة، والتشهاتات العظمية القابلة للتصحيح. يمكن أن يشمل العلاج

- إصلاح أو نقل الأوتار الألوية أو غيرها من الأوتار.
- لوجود أي شذوذ دوري في [ss7] قطع العظم الفخذى - عظم الفخذ
- استئصال/تصغير المدور الأصغر لعظم الفخذ بالمنظار - رأب الإسكيوبلاستي المفتوح - إزالة العظم من عظم - الإسكي لممنع المزيد من الاصطدام
- تنضير الأوتار وإصلاحها -



ما يمكن توقعه بعد الجراحة

يكون التعافي بعد جراحة تنظير المفصل بشكل عام أسرع من التعافي بعد إجراء جراحة مفتوحة، وبالتالي تكون العودة إلى ممارسة الأنشطة أسهل أيضاً. ستعتمد أي عودة للرياضة أيضاً على نتائج الجراحة، وسيتم تقديم المشورة من قبل الجراح المعالج وأخصائي العلاج الطبيعي لحفظ الورك.

قد تكون هناك قيود على حمل الأنقال والأنشطة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأولى، والتي ستحتلي بين الجراحين وستعتمد على نتائج الجراحة والتقنيات التي تم إجراؤها.

يمكن أن يبدأ العلاج الطبيعي بعد الجراحة، مع زيادة نطاق الحركة والثبات والقوية والحركة والوظيفة تدريجياً على مدى فترة تصل إلى ستة أشهر، اعتماداً على الجراحة التي أجريت والأهداف الفردية.